




Fiskehelse og biosikkerhetsplan

Avdeling:	Matfisk
Navn på firma og område:	Ballangen Sjøfarm, Narvik kommune
Gjelder lokalitet:	28196 Kvernes
Ansvarlig	Anders Amundsen
Versjon nr.:	3
Sist revidert:	19.11.2025
Signatur Regionsansvarlig fiskehelse Nordland:	Mikael Wold 

Formål:

- Bidra til en stabil og god produksjon som ivaretar fiskens helse og velferd
- Minske sannsynligheten for introduksjon av utvalgte smittestoff
- Bidra til å unngå etablering og spredning av smitte internt i anlegget, til andre akvakulturanlegg eller villfisk

Biosikkerhetsplanen skal finnes på lokaliteten, og gjelder til enhver tid for all båttrafikk og personale på lokaliteten, inkludert besøkende.

Biosikkerhetsplanen gjennomgås årlig og oppdateres hvis forutsetninger eller helsesituasjonen endrer seg.

Biosikkerhetsplanen skal være signert av regionansvarlig fiskehelse Nordland.



Emneoversikt

Biosikkerhet i matfiskproduksjon	3
Biosikkerhet Kvernes	4
Biosikkerhet, (orden, renhold og hygiene)	13
Holde fisken sunn	14
Holde patogener ute	14
Minimalisere spredning av sykdom internt i anlegget.....	15
Sykdomsutbrudd/akutt dødelighet	15
Vannkvalitet	16
Virussykdommer: IPN, PD, ILA, HSMB, CMS Bakteriesykdommer: Furunkulose, Vibriose, Kaldtvannsvibriose, Vintersår, Tenacibaculose	16
Kontroll på lakselus og skottelus.....	18
Overvåking av fiskehelsestatus	19
Dokumentasjon/ registreringer fiskehelse	19
Håndtering av legemidler og kjemikalier.....	20
Kontroll av restmengde legemidler i filèt	20
Tillatte legemidler og indikasjoner	21
MRL-referanselinker	22

Biosikkerhet i matfiskproduksjon

Biosikkerhet i matfiskoppdrett dreier seg først og fremst om kontroll med smittsomme sykdommer gjennom å hindre introduksjon og spredning av smitte, samt overvåking og sanering etter smitteutbrudd. God biosikkerhet styrker helsen og velferden til laksen.

Vanlige smitteveier

1. **Vertikal smitte.** Sykdomsagens som kan overføres via kjønnsprodukter (melke eller rogn) fra foreldre til avkommet
2. **Horisontal smitte.** Sykdomsagens overføres fra fisk til fisk, enten ved direkte kontakt, overflatesmitte på kjønnsprodukter eller via vannet. Kan også forekomme via passiv smitte med gjenstander eller utstyr
3. **Vektorbåren smitte.** Smitte via en bærerorganisme, f.eks. lakselus, fugler eller andre organismer som kan bære smitten mellom mottakelige individer

Størst risiko for introduksjon og spredning av smitte i matfiskanlegg er ved direkte kontakt med eller inntak av smittet fisk, smitte via sjøvann eller fra båter og utstyr som ikke er tilstrekkelig rengjort og desinfisert. Smitte kan og komme med predatorer og andre organismer som forflytter seg mellom fisk og anlegg. Det anses som usannsynlig med smitte fra luft til fisk, dvs. via bekledning eller aerosoler (dråper). Ved daglig røkting med håndtering av dødfisk og svekket fisk (svimere), vil smitte med all sannsynlighet kunne overføres til arbeidstøyet. Det er derimot svært usannsynlig at smitte fra arbeidstøy skal nå fisken med mindre det benyttes vått og skittent arbeidstøy og at vedkommende faller i havet. Det er uansett viktig med god hygiene i alle ledd i matfiskproduksjon.

I denne planen er de første sidene lokalspesifikke for Kvernes, mens tekstboksene fra s. 8 er hentet fra fiskehelseplanen som omhandler biosikkerhet på mer overordnet nivå.



Biosikkerhet Kvernes

Geografi, anlegg, miljø

Kvernes er plassert sentralt på sørsiden av Ofotfjorden og driftes som et åpent merdanlegg, dvs. not som avgrensing mot ytre miljø.

Kvernes ble klarert for drift i 2007. Fra 2015 til 2018 var anlegget ikke i drift. I 2019 fikk anlegget midlertidig økt MTB, og ble igjen tatt i bruk. Anlegget er plassert i lengderetning nord-sør og føres fra fôrflåte. På lokaliteten benyttes det 160-meters merder. Taknett og hoppegjerde reduserer faren for rømming og skal holde ville dyr ute, både predatorer og f.eks. måke og kråke som i all hovedsak jakter på fôr.

Ved lokaliteten benyttes det en blanding av kombinøter og smoltnøter. Lokaliteten er ikke spesielt strømuttsatt. Forrige B-undersøkelse, gjennomført 20/12/2024 ved maksimal belastning, viste tilstandsgrad 1 – meget god.

Driften ved anlegget har vært god, av smittsomme sykdommer har det de siste produksjonssyklusene blitt påvist PMCV og PRV (virusene som forårsaker hhv. CMS og HSMB), i tillegg til Moritella Viscosa, som forårsaker klassiske vintersår. Disse agensene er vanlige å finne i oppdrettsanlegg for laks. I 2019 var det forekomst av skadelige alger i Ofotfjorden, i tillegg har parasitten Parvicapsula pseudobranchicola vært påvist på nabolokaliteter. Utsettstidspunkt er avgjørende for hvor mottakelig laksen er for denne parasitten, dette hensyntas ved risikovurdering før utsett.


I Ofotfjorden er det 6 andre matfiskanlegg for laks.



Kvernes har koordinert brakklegging med det nærmeste anlegget (Pundsvik).




Spredningsstrømmen er målt på 83 m dyp, og viser at hovedstrømretning forpartikkeltransport er mot sørøst (120 grader). Gjennomsnittlig strømhastighet ble målt til 4,6 cm/s, med maks hastighet målt til 50,5 cm/s.



Relevante nærliggende miljøer

Nærliggende miljøer utgjør en viktig faktor i biosikkerhetsvurderingen rundt oppdrettsanlegg for laks. Disse miljøene kan både være kilde til smitte og fungere som mottaker av smittestoffer fra anlegget. Smitteoverføring kan skje via vannstrømmer, villfisk, fugler og andre organismer som beveger seg mellom sitt miljø og anlegg.

Lakseførende vassdrag:



Lakseførende vassdrag	Avstand fra Kvernnes (luftlinje)
Ballsnesvassdraget	3,2 km
Rånassvassdraget	6,3 km
Laksåvassdraget	11,1 km
Kjellelva	12,3 km
Tårstadvassdraget	13,5 km
Bognesvassdraget	14,1 km
Håkvikelva	15,5 km


Oppsummering av avstander til lakseførende vassdrag i Ofoten.

Gytefelt torsk:




Kvernnes er lokalisert 6,8 km og 1,4 km fra områder (gravert i grå) som er definert som gytefelt for torsk.

Rekefelt:




Kvernnes ligger 8,6 km fra det som er definert som rekefelt.

Fugler:



Artsdatabankens kartverktøy viser 1494 fugleobservasjoner i det omkringliggende området rundt lokalitet Kvernes. Majoriteten av observasjonene er lokalisert i naturreservatet ved Tårstad, ved Ballangseira og Vidrek

Villfisk:



Artsdatabankens kartverktøy viser 258 observasjoner av villfisk i det omkringliggende området rundt lokalitet Kvernes.

Den nyeste smittemodelleringen som er gjennomført for lokaliteten (SINMOD 2020) viser at Kvernes er i smittenettverk med resten av lokalitetene i Ofotfjorden, samt lokaliteter i Tjeldsundet og Sør-Troms. Lokaliteten Stabben fungerer som et bindeledd fra Ofotfjorden til andre lokaliteter utenfor fjorden. Modellen viser at Kvernes mottar sparsomt med lusesmitte fra samtlige lokaliteter i Ofotfjorden, og i omtrent lik grad, mens den mottar virusmitte hovedsakelig fra seg selv og Pundsvik. Modellen viser at Kvernes har potensial til å avgi lusesmitte til samtlige lokaliteter i Ofotfjorden, men at den i størst grad påvirker Pundsvik. Når det gjelder virusmitte viser modellen at Kvernes kan smitte seg selv, Pundsvik, Tjukkeneset og Tortenneset men at den i størst grad påvirker seg selv og Pundsvik.



Figuren viser smittenettverk i Ofotfjorden, Kvernes er markert med rød sirkel.

Smolt

- All smolt skal være vaksinert med godkjent vaksine mot IPNV, furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår forårsaket av *Moritella viscosa* og ha oppnådd immunitet før mottak. Vaksine med ILAV komponent benyttes ved behov.
- All smolt skal være screenet for relevante patogener før mottak. Relevante patogener risikobaseres av fiskehelse.
- PRV/ PMCV opptrer tilnærmet endemisk. Dvs. at vi høyst sannsynlig vil finne fisk som er positive en eller flere ganger i løpet av produksjonstiden i sjø uten at vi nødvendigvis får påvist sykdom eller dødelighet knyttet til disse smittestoffene.
- Konsekvens ved påvist smitte inngår i risikovurderingen før utsett og vi vurderer ut fra prevalens (andel fisk smittet), smittestadium (friske smittebærere eller aktivt virus/sykdom), helsestatus generelt og fare for introduksjon av smitte til og smitte videre til nabolokaliteter.
- Syk fisk skal ikke settes ut. Utsett av grupper med lav prevalens og lav smitte (friske smittebærere) vurderes som akseptabelt. På lang sikt håper vi å kun sette ut smittefri smolt.
- Før utsett skal det gjøres en risikovurdering hvor biosikkerhet inngår som et sentralt element sammen med fiskehelse og -velferd, se vedlegg 1
- Transport av smolt skal foregå med bruk av utvalgte brønnbåter fortrinnsvis båter i fast charter eller båter som kun frakter smolt.

Besøkende og personell

- Personell og alle besøkende skal sluses inn og forlate anlegget via hovedinngangen.
- Besøkende skal signere besøksprotokolen som skal ligge lett tilgjengelig.
- Personell skal ved arbeid ute på merdanlegget benytte inngangen til garderobeområdet og skal bruke ytterbekledning inkl. fottøy fra bedriften, alt etter årstid.
- Besøkende som skal ut på merdanlegget og som skal i kontakt med fisken eller utstyr som står i vann, skal fortrinnsvis benytte ytterbekledning inkl. fottøy utlånt fra lokaliteten. Unntak fra kravet om ytterbekledning vil normalt gjelde personell på brønnbåt og andre servicebåter som stiller i egen bekledning.
- Besøkende som ikke skal i kontakt med fisken eller utstyr i vann på merdanlegget, kan benytte egne arbeidsklær inkl. fottøy dersom disse anses egnet.
- Eget arbeidstøy som besøkende får benytte ute på merdanlegget skal være rent og tørt
- Bekledning inkl. fottøy og pålagt verneutstyr til utlån på lokaliteten skal vaskes etter bruk og være i god stand.



Båter og båttrafikk

- Lokalteteten disponerer arbeidsbåt.
- Arbeidsbåten skal vaskes og desinfiseres daglig.
- All unødig båttrafikk skal unngås, dette gjelder også internt.
- For fritidsbåter, fiskebåter o.l. gjelder ferdselsforbudet innenfor 200 m fra anlegget.
- Ved all båttrafikk inn til anleggssonen skal biosikkerhetsplan for PO9 følges, se vedlegg.
- Bruk av båter i fast charter er å foretrekke.

Ved større operasjoner som f.eks. avlusing kan det være nødvendig å ta inn arbeidsbåter fra andre lokaliteter i Ballangen Sjøfarm eller Cermaq. Før båtene kommer inn i merdanlegget skal de være vasket og desinfisert og alt unødig utstyr skal være fjernet som f.eks. stamper eller kar til dødfiskhåndtering, håndhåver mm. Når båtene forlater Kvernes, skal de vaskes og desinfiseres før de går tilbake til egen lokalitet.

Utstyr

- Lokalteteten skal disponere alt utstyr som trengs til daglig drift, inkl. avkastnot og kar til lusetelling.
- Alt utstyr skal vaskes og desinfiseres etter bruk.
- Nøtene impregneres for å redusere/hindre groe. Det er derfor ikke behov for regelmessig spyling av nøter som stresser fisken og gir utslipp av biologisk materiale som kan være skadelig for fisken. Groe på nøtene kan påvirke miljøet i merdene negativt ved bl.a. redusert vannutskifting og bidra til økt fare for smitte til laksen.
- Håndhåv brukt til opptak av dødfisk skal ikke benyttes til svimerplukking i etterkant.
- Utstyr som brukes i sjøen i kontakt med fisk skal i hovedregelen ikke lånes ut til eller lånes fra andre lokaliteter. Dersom det likevel er helt nødvendig å låne utstyr skal det være rengjort og desinfisert før det tas inn eller forlater lokaliteten. Det skal ikke under noen omstendighet lånes ut utstyr eller lånes utstyr fra lokaliteter ved mistanke om eller påvist alvorlig sykdom (typisk PD eller ILA)
- Utstyr skal ikke lagres i umiddelbar nærhet av dødfiskkverna og lasting/lossing av utstyr skal ikke foregå i dette området av flåta når det er fisk i anlegget.

Dødfisk, opptak og håndtering

- Dødfisk skal fjernes hver dag og ved behov, flere ganger daglig.
- Det skal benyttes egne stamper/kar som er tette, ingen avrenning tolereres.
- Dødfisk skal kvernes og ensileres fortløpende etter opptak. Dødfisk skal ikke lagres i kar eller på annen måte før ensilering.
- Ensilasjen skal være merket med rett kategori og leveres til godkjent mottaker.
- Det er kun fisk og fiskeavfall som skal i ensilasjen. Annet biologisk avfall skal håndteres på annen måte.
- Området rundt kverna og utstyr som er brukt skal vaskes og desinfiseres etter bruk.
- Dersom mengden dødfisk overstiger kapasiteten på anlegget skal CN stille med nødvendig kapasitet. Om nødvendig skal det benyttes ensilasjebåt for å forhindre opphoping av dødfisk i merdene eller i kar.
- Ved mistanke om eller ved påvist sykdom eller ved økt uavklart dødelighet, skal friske merder røktes først og syke merder røktes sist. Utstyr brukt i friske merder skal holdes atskilt fra utstyr som benyttes i syke merder
- Dødfisk skal håndteres på lokaliteten, det skal ikke fraktes dødfisk til annen lokalitet for ensilering.



Biosikkerhet, (orden, renhold og hygiene)

Formål:

Holde et rent og trygt miljø for fisken og redusere eksponering mot, introduksjon og spredning av smittsomme sykdommer

Forebyggende tiltak:

- Båter, flåter og anlegg skal holdes ryddig og rene. Renholdsplan skal følges (nivå grønn)
- Utstyr som brukes til dødfisk skal være adskilt fra utstyr som brukes på levende fisk eller være tilstrekkelig rengjort og desinfisert før bruk på levende fisk
- Unødig trafikk av eksterne båter i anlegget eller besøkende skal unngås
- Alle besøkende og ansatte, skal sluses inn i anleggssonen

Korrigerende tiltak:

- Beredskapsplanverk
- Renholdsplanrød sone

Ansvar:

Driftsleder

Prosedyre – dokumentnummer

- Beredskapsplaner Ballangen Sjøfarm
- Prosedyre for montering, ettersyn og vedlikehold matfisk
- Prosedyre for renhold og hygiene - flåte, anlegg, båter og tilhørende utstyr
- Renholdsplan - matfisk (ink båt, ensilasje og dødfiskutstyr)
- Prosedyre for daglig ettersyn og røkting matfisk
- Prosedyre for håndtering av dødfisk, svimere og ensilasje
- Prosedyre for ekstern båttrafikk i anlegget
- Prosedyre for besøkende - matfisk
- Prosedyre for risikovurdering
- Hygieneinstruks - matfisk
- Kompetansekrav - matfisk
- Kravspesifikasjon eksterne smoltlevernadører Ballangen Sjøfarm og Cermaq
- Prosedyre for renholdskontroll av brønnbåt ved smoltføring
- Prosedyre for levering og mottak av smolt
- Prosedyre for kontroll, ettersyn og renhold av not
- Prosedyre for driftsplan og rapportering om drift matfisk
- Prosedyre for helsekontroll - matfisk
- Prosedyre for ivaretagelse av fiskevelferd og -helse
- Prosedyre for Real-time RT-PCR screening
- Prosedyre for brønnbåt inn og ut av sykdomssonen
- Prosedyre for samspill mellom dyr og fugler



Holde fisken sunn
Formål: Å holde fisken så sunn som mulig er viktig for å holde sykdom ute eller redusere risikoen for spredning av sykdom
Forebyggende tiltak: • Kontroll med predatorer utføres fortløpende og ved behov. • Bruke fuglenett slik at man reduserer fugleaktivitet • Fisken skal ha tilgang på rett mengde med fôr hver dag. Fôr skal være tilpasset størrelse og livsstadium • Kontroll på fôring og daglig opptak av dødfisk slik at man unngår tiltrekking av villfisk til anlegget. • Bruk av luselaser og helsefôr for å forebygge påslag av lakselus, utvikling av sår eller redusere omfanget av hjerterelaterte lidelser kan kun brukes etter avtale med produksjonsledelsen og Fiskehelseavdelingen. • Unødig håndtering og stressbelastninger skal unngås
Korrigerende tiltak: • Hvis fiskens helsetilstand tilsier det kan man benytte helsefôr i en lengre periode • Medikamentell behandling benyttes kun hvis foreligger indikasjon (bekreftet diagnose) og etter forskrivning av fiskehelsepersonell. • Ved økt dødelighet/svining skal frekvensen på plukking av dødfisk og svimere økes
Ansvar: Driftsleder
Prosedyre – dokumentnummer Samme referanser som under biosikkerhet • Prosedyre for samspill mellom dyr og fugler • Prosedyre for fôring - matfisk • Prosedyre for sulting - matfisk • Prosedyre for fôrmottak, lagring og kontroll av fôr • Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og - avfall • Prosedyre for lusetelling • Prosedyre og plan for kjemisk kontr

Holde patogener ute
Formål: Sikre at smitte ikke blir introdusert til anleggene våre
Forebyggende tiltak: • Unødig bruk av eksternt utstyr og båter skal unngås • Utstyr og båter som skal tas inn i anlegget skal være tilstrekkelig rengjort og desinfisert • Besøk til anlegget skal være avtalt og avklart på forhånd og besøkende skal benytte seg av lokalitetens egne klær og eget utstyr dersom de skal ut på merdene • Biologisk materiale skal ikke tas inn i eller ut fra anlegget
Korrigerende tiltak: • Beredskapsplanverk
Ansvar: Driftsleder



Prosedyre – dokumentnummer

Samme referanser som nevnt under biosikkerhet

Minimalisere spredning av sykdom internt i anlegget

Formål:

Tilstrekkelig renhold og hygiene, samt fornuftig dødelighetshåndteringer viktig for å holde fisken frisk og eksponert for så lite smitte som mulig

Forebyggende tiltak:

- Unødig bruk av eksternt utstyr og båter skal unngås
- Utstyr og båter som skal tas inn i anlegget skal være tilstrekkelig rengjort og desinfisert
- Besøk til anlegget skal være avtalt og avklart på forhånd og besøkende skal benytte seg av lokalitetens egne klær og eget utstyr dersom de skal ut på merdene
- Biologisk materiale skal ikke tas inn i eller ut fra anlegget

Korrigerende tiltak:

- Beredskapsplanverk

Ansvar:

Driftsleder

Prosedyre – dokumentnummer

Samme referanser som nevnt under biosikkerhet

- Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og - avfall

Sykdomsutbrudd/akutt dødelighet

Formål:

Sikre at man håndterer utbrudd av sykdom eller akutt dødelighet effektivt slik at det får minst mulig konsekvens for resten av fisken i anlegget, nærliggende anlegg og villfisk

Forebyggende tiltak:

- Holde fisken sunn
- Holde patogener ute, kontroll på smitte fra settefisk
- God vannkvalitet
- Overvåking av fiskehelsestatus

Korrigerende tiltak:

- Frekvensen på røkting av dødfisk og svimere økes
- Ledelsen, Mattilsynet, Fiskehelsepersonell og andre aktører varsles
- Årsaksforhold oppklares
- All unødig trafikk inn og ut av anlegg og håndtering av fisk unngås
- Syk fisk skal ikke flyttes
- Renholdsplan - nivå gul/rød
- Beredskapsplanverk
- Medikamentell behandling iverksettes hvis dette er nødvendig
- Enheter med smitte, sykdom og høy dødelighet isoleres, blir vurdert nødslaktet eller destruert/sanert avhengig av årsak og omfang

Ansvar:

Driftsleder, leder sjø, leder fiskehelse, regionansvarlig fiskehelse

Prosedyre – dokumentnummer

Samme referanser som nevnt under biosikkerhet



Vannkvalitet
Formål: God vannkvalitet og god kontroll på vannparametere er en forutsetning for god fiskehelse og velferd
Forebyggende tiltak: • Vannkvalitet, dvs temperatur, salinitet, alger, maneter og begroing skal overvåkes regelmessig og minimum i hht myndighetskrav • Varsle linjeleder ved observasjon av misfarging av havet og forekomst av unormalt store mengder maneter • Nøtene skal rengjøres regelmessig, alt etter behov
Korrigerende tiltak: • Beredskapsplanverk • Frekvens på røkting av dødfisk og svimere økes • Fôringen stoppes, justeres ned eller forskyves til annet tidspunkt på døgnet, alt etter årsak • Om relevant prøvetas vannet for å oppklare årsaksforhold
Ansvar: Driftsleder
Prosedyre – dokumentnummer Beredskapsplaner for Ballangen Sjøfarm.

Virussykdommer: IPN, PD, ILA, HSMB, CMS Bakteriesykdommer: Furunkulose, Vibriose, Kaldtvannsvibriose, Vintersår, Tenacibaculose
Formål: Redusere omfanget av smitte av bakterie- og virussykdommer
Forebyggende tiltak: • Smolten skal ved utsett være vaksinert med godkjent vaksine mot IPNV, furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår forårsaket av <i>Moritella viscosa</i> • Holde fisken sunn • Holde patogener ute og kontrollere smittestatus på settefisk • God vannkvalitet, overvåke vannkvaliteten • Overvåke fiskehelsestatus • Overvåke sykdomsagens som bestemt av myndighetene • Månedlig screening av 20 stk. fisk for PD-virus i overvåkingssone • Månedlig screening av minimum 10 stk. fisk for ILAV i overvåkingssone



Korrigerende tiltak:

- Frekvensen på røkting av dødfisk og svimere økes
- Ledelsen, Mattilsynet, Fiskehelsepersonell og andre aktører varsles
- Årsaksforhold oppklares
- All unødig trafikk inn og ut av anlegg og håndtering av fisk unngås
- Syk fisk skal ikke flyttes
- Renholdsplan – nivå gul/rød
- Beredskapsplanverk
- Medikamentell behandling iverksettes etter indikasjon hvis strengt nødvendig
- Enheter med smitte, sykdom og høy dødelighet isoleres, blir vurdert nødslaktet eller destruert/sanert avhengig av årsak og omfang

Ansvar:

Driftsleder, leder sjø, leder fiskehelse, regionansvarlig fiskehelse

Prosedyre – dokumentnummer

Samme referanser som under biosikkerhet



Kontroll på lakselus og skottelus

Formål:

Ha oversikt over og kontroll på parasittstatus i anlegget

Forebyggende tiltak:

- Lakselus og skottelus skal telles ukentlig. Ved bruk av digitale løsninger (Optoscale/Stingray/Aquabyte) telles lus iht. godkjenning fra Mattilsynet og den aktuelle leverandørens anbefalinger. Ved manuell telling skal det telles lus på 20 fisk fra hver merd, hver uke. Ved sjøtemperatur under 4 °C kan det telles annenhver uke. Resultater fra lusetellingen legges inn i Fishtalk uten unødig opphold.

Personell som teller lus, skal ha gyldig opplæring

- Samme som under overvåking av fiskehelsestatus
- Luseskjørt
- Luselasere (Stingray)
- Påslagshemmende fôr kan kun brukes etter avtale med produksjonsledelsen og i samråd med Fiskehelsepersonell

Korrigerende tiltak:

- Før nivå av kjønnsmodne hunnlus når 0,5 i perioden uke 27-20 eller 0,2 i perioden uke 21-26 iverksettes tiltak i enkeltmerder eller hele anlegget
- Tiltak mot skottelus iverksettes dersom helse og velferden til laksen er i fare
- Avlusning ved bruk av godkjente legemidler
- Avlusning ved bruk av ikke medikamentelle metoder

Ansvar:

Driftsleder, fiskehelsepersonell

Prosedyre – dokumentnummer

- Samordnet plan for lusebekjempelse i Nordland Nord
- Vedlegg til samordnet plan for lusebekjempelse - sone 7 – Ballangen
- Prosedyre for samordnet kontroll og bekjempelse av lakselus
- Prosedyre for lusetelling
- Prosedyre for avlusing med lukket presenning
- Prosedyre for avlusing ved bruk av Slice
- Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og - avfall
- Prosedyre for bekjempelse av lakselus med nedsatt følsomhet/resistens mot legemidler
- Prosedyre for rapportering av lakselus
- Prosedyre for forberedelser på utsett og mottak av rognkjeks
- Prosedyre for utsett av rognkjeskjul
- Prosedyre for avlusning ved bruk av Ikke Medikamentelle Metoder (IMM - Optilicer, Hydrolicer og Ferskvann)



Overvåking av fiskehelsestatus

Formål:

Regelmessig overvåking av fisken for tegn på lidelser eller sykdom er kritisk for å ha kontroll med fiskens helsestatus

Forebyggende tiltak:

- Fiskens adferd, helse- og velferdsstatus skal overvåkes hver dag
- All dødfisk skal klassifiseres etter dødelighetsårsak i Fishtalk etter veiledning fra fiskehelsepersonell og i samsvar med dødfiskveilederen
- Lokaliteten skal ha regelmessige tilsyn med uttak av relevante prøver utført av autorisert fiskehelsepersonell

Korrigerende tiltak:

- Fiskehelsepersonell varsles ved episoder og akuttbesøk gjennomføres
- Utvidet prøvetaking utføres for å oppklare årsaksforhold

Ansvar:

Driftsleder og fiskehelsepersonell

Prosedyre – dokumentnummer

- Prosedyre for helsekontroll – matfisk
- Beredskapsplaner for Ballangen Sjøfarm
- Prosedyre for lusetelling
- Prosedyre for ivaretagelse av fiskevelferd og -helse

Dokumentasjon/ registreringer fiskehelse

Formål:

Sikre at nedtegnelsen av fiskens helse og velferdsstatus på lokaliteten til enhver tid er sikret og tilgjengelig for personell på lokaliteten samt for annet relevant personell

Forebyggende og korrigerende tiltak:

- Dødelighet, destruksjon, dødelighetsårsak og behandlinger skal loggføres i Fishtalk.
- Rapporter fra tilsynsførende fiskehelsepersonell, diagnoser og prøvesvar fra Veterinærinstituttet, PatoGen analyse og/eller andre godkjente laboratorier oppbevares på lokaliteten og skal være kjent av alt driftspersonell

Ansvar:

Driftsleder

Prosedyre – dokumentnummer

- Prosedyre for helsekontroll – matfisk
- Prosedyre for journalføring – matfisk
- Helserapporter
- Screeningrapporter
- Prosedyre for besøkende - matfisk
- Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og - avfall



Håndtering av legemidler og kjemikalier

Formål:

Sikre at man kun bruker legemidler og kjemikalier som til enhver tid er godkjent, at bruken kun er slik som foreskrevet av tilsynsførende fiskehelsepersonell. At man ikke bruker legemidler/kjemikalier unødige, og at håndteringen er på en slik måte at fiskehelsen, brukerens helse, og miljøet ikke står i fare.

Forebyggende tiltak:

- All unødig bruk unngås.
- All bruk dokumenteres i Fishtalk.
- Alle som skal bruke legemidler skal ha medhjelpers kurs og opplæring i bruk av det respektive legemiddelet.

Korrigerende tiltak:

- Bortsett fra regelmessig bruk av bedøvelse og sedasjon, skal bruk av legemidler kun foregå når fiskens helse- og eller velferds-tilstand strengt tatt tilsier dette. All bruk i samråd med fiskehelsepersonell.

Ansvar:

Driftsleder

Prosedyre – dokumentnummer

- Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og -avfall
- Prosedyre for lagring, håndtering og bruk av kjemikalier og gasser

Kontroll av restmengde legemidler i filèt

Formål:

Sikre at fisk som går til slakt ikke har rester av legemidler i filèt, eller et nivå som er lavere enn den til enhver tid gjeldende MRL-verdien for legemiddelet

Forebyggende tiltak:

- Det skal tas ut filètprøver (NQC-snitt) for MRL-analyser av fiskegrupper der det er benyttet antibiotika innen 3 mnd. før slakt. Er også aktuelt ved tidlig slakt etter medikamentell avlusing kort tid før slakt etter vurdering ut fra fiskehelse, miljøforhold mm.

Korrigerende tiltak:

- Ved restmengde eller mistanke om restmengde legemiddel, eller ved MRL-verdier over gjeldende grenser skal fisken holdes tilbake, og oppfølgingprøver tas ut i samråd med fagavdelingene i CEQN (kvalitet og fiskehelse)

Ansvar:

Driftsleder

Prosedyre – dokumentnummer

- Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og -avfall

Oversikt og tilgang til "Critically important Antimicrobials for Human Medicine" (1), "Aquatic animal health code" (2) og "Codex Alimentarius" (3).

- 1) <https://www.oie.int/en/standard-setting/aquatic-code/access-online/>
- 2) [9789241515528-eng.pdf \(who.int\)](https://www.who.int/publications-detail/9789241515528-eng)
- 3) <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/3e8f13a7-671c-4418-af79-1a8cfd1d0d14/content>



Tillatte legemidler og indikasjoner			
Sedasjon, bedøvelse og avlving *			
Legemiddel	Aqui S vet.	Benzoak	Finquel vet.
Aktiv substans	Isoeugenol	Benzokain	Trikainmesilat
Indikasjon	Sedasjon/bedøvelse	Sedasjon/bedøvelse	Sedasjon/bedøvelse
Leverandør	MSD Animal Health	ACD Pharmaceuticals	MSD Animal Health
Administrasjonsmåte	Bad	Bad	Bad
Tilbakeholdelsestid	2 døgnggrader	7 døgnggrader	25 døgnggrader
MRL	6mg/kg	No established	N/A
MRL-referanse	MRL Aqui S	MRL Benzoak	MRL Finquel
WHO classification antimicrobials 5 th rev 2016	N/A	N/A	N/A
MTnummer	10-8077	97-4919	02-1257
Avlusing			
Legemiddel	Alpha Max	Azasure vet.	Salmosan vet.
Aktiv substans	Deltametrin	Azametifos	Azametifos
Indikasjon	Lakselus	Lakselus og skottelus	Lakselus og skottelus
Leverandør	Pharmaq	Ground Animal Health Ltd.	Benchmark Animal Health
Administrasjonsmåte	Bad	Bad	Bad
Tilbakeholdelsestid	5 døgnggrader	10 døgnggrader	10 døgnggrader
MRL	N/A	No established	No established
MRL-referanse	MRL Alpha Max	MRL Azasure	MRL Salmosan
WHO classification antimicrobials 5 th rev 2016	N/A	N/A	N/A
MTnummer	99-8073	13-9411	13-9882
Legemiddel	Slice	Paramove	Nemona
Aktiv substans	Emamectin benzoat	Hydrogenperoksid	Hydrogenperoksid
Indikasjon	Lakselus	Lakselus og skottelus	Lakselus og skottelus
Leverandør	MSD Animal Health	Aqua Pharma	Nouryon
Administrasjonsmåte	Oral	Bad	Bad
Tilbakeholdelsestid	175 døgnggrader	Ingen	Ingen
MRL	100 µg/kg	N/A	N/A
MRL-referanse	MRL Slice	MRL Paramove	MRL Nemona
WHO classification antimicrobials 5 th rev 2016	N/A	N/A	N/A
MTnummer	99-4254	11-8486	11-8574

Legemiddel	Ectosan		
Aktiv substans	Imidakloprid		
Indikasjon	Lakselus		
Leverandør	Benchmark Animal Health		
Administrasjonsmåte	Bad, brønnbåt/Clean treat		
Tilbakeholdelsestid	98 døgngader		
MRL	N/A		
MRL-referanse	MRL Ectosan		
WHO classification antimicrobials 5 th rev 2016	N/A		
MTnummer	20-13358		
Antibiotika			
Legemiddel	Floraqpharma		
Aktiv substans	Florfenicol		
Indikasjon	Bakteriell sårinfeksjon		
Leverandør	Skretting, Biomar		
Administrasjonsmåte	Oral		
Tilbakeholdelsestid	150 døgngader		
MRL	1000 µg/kg		
MRL-referanse	MRL Floraqpharma		
WHO classification antimicrobials 5 th rev 2016	Highly important (Criterion 2 only)		
MTnummer	8035		

*Avliving av mindre mengder fisk med overdose bedøvelse under daglig røkting, dvs. svimere og svekket eller skadet fisk

MRL-referanselinker	
Aqui-S vet.	Isoeugenol: European Public MRL Assessment Report (EPMAR) - Committee for Veterinary Medicinal Products
Finquel vet.	Tricaine mesilate (europa.eu)
Alpha Max	Deltamethrin 4 Fin fish
Salmosan vet.	Azamethiphos - European Public MRL Assessment Report (EPMAR) - Committee for Veterinary Medicinal Products
Slice vet.	CVMP Summary Report Emamectin 2 fin fish
Floraqpharma vet.	MRL, Florfenicol (extension to fish) summary report (5)
Ectosan Vet.	European public MRL assessment report for imidacloprid
Benzaok vet.	CVMP - MRL - Benzocaine (extension to Salmonidae) Summary Report (2)

